



BACHADON MIOMASI: ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTIKASI VA ZAMONAVIY
DAVOLASH USULLARI

Кодиржанова Дильшода

*Central Asia Medical Institute Кафедра Акушерство гинекология и неонатология
Ординатор 1 курс*

Каюмова З Б

Научный руководитель: -заместитель главного врача по лечебной работе

Annotatsiya: *Bachadon miomasi (МКБ-10: D25) reproduktiv yoshdagi ayollar orasida keng tarqalgan yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi. Ushbu maqolada bachadon miomasining etiologiyasi, klinik kechishi, diagnostika usullari va zamonaviy davolash tamoyillari tahlil qilindi. Erta aniqlash va individual yondashuv asosida davolash reproduktiv salomatlikni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *bachadon miomasi, leyomioma, menorragia, bepushtlik, miomektomiya, embolizatsiya.*

KIRISH

Bachadon miomasi (leyomioma) bachadonning mushak qavatidan rivojlanadigan gormonga bog'liq benign o'sma hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 30–50 yoshdagi ayollarning 20–40% ida uchraydi. Kasallikning rivojlanishida estrogen va progesteron gormonlari muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda kasallik yosharganligi kuzatilmoqda.

Tadqiqot maqsadi

Bachadon miomasining rivojlanish omillari, klinik belgilari va samarali davolash usullarini o'rganish hamda zamonaviy yondashuvlarni tahlil qilish.

Material va usullar

Tadqiqot davomida reproduktiv yoshdagi ayollarda klinik kuzatuv, ginekologik ko'rik, ultratovush tekshiruvi (UTT), laborator tahlillar va instrumental diagnostika natijalari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar tahliliy va statistik usulda baholandi.

Natijalar va muhokama

Etiologiya va patogeneza

Gormonal disbalans (giperestrogeniya)

Irsi moyillik

Kech reproduktiv davr

Semizlik va metabolik sindrom

Surunkali yallig'lanish kasalliklari

Mioma tugunlari subseroz, intramural va submukoz turlarga bo'linadi. Submukoz tugunlar ko'proq hayz buzilishlariga sabab bo'ladi.

Klinik ko'rinishlar

Ko'p va uzoq davom etuvchi hayz qon ketishlari (menorragiyalar)

Qorinning pastki qismida og'riq

Anemiya

Siydik ajralishining buzilishi



Bepushtlik

Ba'zi hollarda kasallik simptomsiz kechishi mumkin.

Diagnostika

Bimanual ginekologik ko'rik

Ultrasonografiya (asosiy usul)

Gisteroskopiya

MRT (murakkab holatlarda)

Gemoglobin darajasini aniqlash

Davolash

Konservativ davo:

Gormonal terapiya (KOK, gestagenlar)

GnRH agonistlari

Simptomatik gemostatik terapiya

Jarrohlik davo:

Miomektomiya (organ saqlovchi operatsiya)

Gisterektomiya

Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi

Davolash usuli bemorning yoshi, tug'ruq rejalari va tugun hajmiga qarab tanlanadi.

Xulosa

Bachadon miomasi keng tarqalgan ginekologik patologiya bo'lib, ayollarning reproduktiv salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Erta diagnostika, individual yondashuv va zamonaviy minimal invaziv usullarni qo'llash davolash samaradorligini oshiradi va asoratlarni kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Berek & Novak's Gynecology. 16th edition.

Williams Gynecology. 4th edition.

O'zbekiston Respublikasi SSV klinik protokollari (ginekologiya bo'yicha).

WHO recommendations on women's health, 2022.