

## РОЛЬ УЗИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Жумабоев А. Ш

*Ташкентского государственного медицинского университета*

**Аннотация:** Осложнения хронического панкреатита могут проявляться по-разному у мужчин и женщин. У мужчин заболевание чаще связано с длительным употреблением алкоголя, поэтому у них нередко наблюдаются выраженные структурные изменения железы [1]. У женщин хронический панкреатит чаще развивается на фоне заболеваний желчевыводящих путей, гормональных нарушений и обменных расстройств [2,3].

**Ключевые слова:** хронический панкреатит, ультразвуковая диагностика, поджелудочная железа, ранняя диагностика, визуализационные методы.

**Цель исследования:** Изучить мультипараметрически ультразвуковое исследование признаки в ранней диагностике панкреатите.

**Материал и методы:** В изучение были включены 65 пациентов с клиническими признаками хронического панкреатита, находившихся на обследовании и лечении. Среди них было 37 мужчин (56,9%) и 28 женщины (43,1%) в возрасте от 31 до 61 лет. В ходе исследования применялись следующие виды ультразвуковой диагностики: Стандартное трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование с цветовым доплеровски картированием для оценки сосудистого рисунка; Основные причины такие: Из них у 30 отмечалось ожирение, у 35 — сахарный диабет А и В. Пациенты с хроническим панкреатитом были исследованы в гастроэнтерологическом отделении.

Так, при исследовании группы из 65 пациентов с клиническими признаками хронического панкреатита ультразвуковые признаки заболевания были выявлены у 49 человек, что составило 75,4%. На поздних стадиях хронического панкреатита диагностическая чувствительность Ультразвуковое исследование достигает 80-82%, что подтверждает его высокую клиническую ценность. В связи с этим при необходимости Ультразвуковое исследование дополняют другими методами визуализации, такими как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и эндоскопическая ультрасонография.

**Заключение.** Ультразвуковое исследование является незаменимым методом первичного обследования и динамического наблюдения пациентов с хроническим панкреатитом, а также способствует своевременному выявлению осложнений и оценке эффективности проводимого лечения

**Вывод:** Ультразвуковое исследование — доступный, безопасный и достаточно информативный метод диагностики хронического панкреатита,

позволяющий выявлять структурные изменения и контролировать течение заболевания в динамике.

### ЛИТЕРАТУРА:

1. Drake M., et al. Sex-Related Differences of Acute and Chronic Pancreatitis in Adults. J Clin Med. 2021;10(2):300.
2. Romagnuolo J., et al. Chronic Pancreatitis in Women: Typically Not Related to Alcohol Use. Clinical Advisor, 2020.
3. Global Burden of Disease Study 2019, Chronic Pancreatitis: Epidemiology and Gender Differences. BMC Med. 2020;18:105.